


# **Formelsammlung**

# für den Mittleren Schulabschluss in Schleswig-Holstein

- gültig ab: 2015/16 -

Figuren			
b h a	<b>Dreieck</b> Flächeninhalt $A = \frac{g \cdot h}{2} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin(\gamma)$ Umfang $u = g + a + b$	g h a,b γ	Grundseite Höhe Seiten Winkel
а	<b>Quadrat</b> Flächeninhalt $A = a^2$ Umfang $u = 4 \cdot a$	a	Seite
b	Rechteck  Flächeninhalt $A = a \cdot b$ Umfang $u = 2 \cdot a + 2 \cdot b$	a,b	Seiten
	<b>Raute</b> Flächeninhalt $A = g \cdot h = \frac{e \cdot f}{2}$ Umfang $u = 4 \cdot g$	g h e,f	Grundseite Höhe Diagonalen
b g	Parallelogramm  Flächeninhalt $A = g \cdot h$ Umfang $u = 2 \cdot g + 2 \cdot b$	g b h	Grundseite Seite Höhe
	<b>Trapez</b> Flächeninhalt $A = m \cdot h = \frac{a+c}{2} \cdot h$ Umfang $u = a+b+c+d$	a,c b,d m h	Seiten (a    c) Seiten Mittelparallele Höhe
e b	<b>Drachenviereck</b> Flächeninhalt $A = \frac{e \cdot f}{2}$ Umfang $u = 2 \cdot a + 2 \cdot b$	a,b e,f	Seiten Diagonalen
	<b>Kreis</b> Flächeninhalt $A = \pi \cdot r^2$ Umfang $u = 2 \cdot \pi \cdot r = \pi \cdot d$	π ≈ d r	3,14 Durchmesser Radius

# Körper




#### Würfel

Volumen  $V = a^3$ 

Oberfläche  $O = 6 \cdot a^2$ 

a Kante




# Quader

Volumen  $V = a \cdot b \cdot c$ 

Oberfläche  $O = 2 \cdot (a \cdot b + b \cdot c + a \cdot c)$ 

a,b,c Kanten



## Zylinder

Volumen  $V = G \cdot k = \pi \cdot r^2 \cdot k$ 

Mantelfläche  $M = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot k = \pi \cdot d \cdot k$ 

Mantematic M = 2 · R · I · K = R · G · K

Oberfläche  $O = 2 \cdot G + M = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot (r + k)$ 

 $\pi \approx 3,14$ 


G

d Durchmesser

r Radius

*k* Körperhöhe

Grundfläche



# (gerades) Prisma

Volumen  $V = G \cdot k$ 


Mantelfläche  $M = u \cdot k$ 

Oberfläche  $O = 2 \cdot G + M$ 

*k* Körperhöhe

*G* Grundfläche

*u* Umfang



#### **Pyramide**


Volumen  $V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot k$ 

Oberfläche O = G + M

G Grundfläche

*M* Mantelfläche

*k* Körperhöhe



#### Kegel

Volumen  $V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot k = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot k$ 

Mantelfläche  $M = \pi \cdot r \cdot s$ 

Oberfläche  $O = G + M = \pi \cdot r \cdot (r + s)$ 

 $\pi \approx 3,14$ 


G Grundfläche

M Mantelfläche

*r* Radius

s Mantellinie

k Körperhöhe



# Kugel

Volumen  $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$ 

Oberfläche  $O = 4 \cdot \pi \cdot r^2$ 

 $\pi \approx 3,14$ 

*r* Radius

d Durchmesser

# Satzgruppe des Pythagoras

# b<sup>2</sup> Kathete D San a<sup>2</sup> Hypotenuse c C<sup>2</sup>

# Satz des Pythagoras


Die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate ist so groß wie der Flächeninhalt des Hypotenusenquadrats.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

a,b Katheten

c Hypotenuse

#### **Kathetensatz**




$$a^2 = c \cdot p$$

$$b^2=c\cdot q$$

*a,b* Katheten

*c* Hypotenuse

p,q Hypotenusenabschnitte



# Höhensatz

$$h^2 = p \cdot q$$

*h* Höhe

p,q Hypotenusenabschnitte

### **Trigonometrie**

## Winkelfunktionen




 $sin(\alpha) = \frac{Gegenkathete}{Hypotenuse}$ 

 $cos(\alpha) = \frac{Ankathete}{Hypotenuse}$ 

 $tan(\alpha) = \frac{\textit{Gegenkathete}}{\textit{Ankathete}}$ 

α Winkel


#### **Sinussatz**



$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)}$$

a,b,c Seiten  $\alpha,\beta,\gamma$  Winkel

# Kosinussatz



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos(\alpha)$$

a,b,c Seiten  $\alpha$  Winkel

# Masse eines Körpers

Masse  $m = V \cdot \rho$ 

V Volumen

Dichte

# **Prozentrechnung**

Prozentwert  $W = G \cdot \frac{p}{100}$ 

Prozentzahl  $p = \frac{W}{G} \cdot 100$ 

Grundwert  $G = W \cdot \frac{100}{n}$ 

G Grundwert

Prozentzahl р

Prozentwert

# **Zinsrechnung**

Jahreszinsen  $Z = K \cdot \frac{p}{100}$ 

Monatszinsen  $Z_m = K \cdot \frac{p}{100} \cdot \frac{m}{12}$ 

Tageszinsen  $Z_t = K \cdot \frac{p}{100} \cdot \frac{t}{360}$ 

 $q = 1 + \frac{p}{100}$ 

Kapital mit Zinseszins  $K_n = K_0 \cdot q^n$ 

Κ Kapital

Startkapital  $K_o$ 

Prozentzahl

Wachstumsfaktor q

**Anzahl Monate** m

Anzahl Tage t

Anzahl Jahre n

# **Binomische Formeln**

#### 1. Binomische Formel

$$(a+b)^2 = a^2 + 2 \cdot a \cdot b + b^2$$

# 2. Binomische Formel


 $(a-b)^2 = a^2 - 2 \cdot a \cdot b + b^2$ 

a,b reelle Zahlen

#### 3. Binomische Formel

$$(a+b) \cdot (a-b) = a^2 - b^2$$

#### Strahlensätze



## 1. Strahlensatz

$$\frac{|\overline{ZA}|}{|\overline{ZA}'|} = \frac{|\overline{ZB}|}{|\overline{ZB}'|}$$

$$\frac{|\overline{ZA}|}{|\overline{ZA}'|} = \frac{|\overline{ZB}|}{|\overline{ZB}'|} \qquad \qquad \frac{|\overline{ZA}|}{|\overline{AA}'|} = \frac{|\overline{ZB}|}{|\overline{BB}'|}$$

$$Z$$
 Zentrum  $s_1, s_2$  Strahlen

g,h Geraden  $(g \parallel h)$ 


A, A' Punkte

B,B' Punkte

$$\frac{|\overline{AB}|}{|\overline{A'B'}|} = \frac{|\overline{ZA}|}{|\overline{ZA'}|} \qquad \qquad \frac{|\overline{AB}|}{|\overline{A'B'}|} = \frac{|\overline{ZB}|}{|\overline{ZB'}|}$$

$$\frac{|\overline{AB}|}{|\overline{A'B'}|} = \frac{|\overline{ZB}|}{|\overline{ZB'}|}$$

# **Quadratische Funktionen**



# **Normalparabel**


$$f(x)=x^2$$

# gespiegelte Normalparabel

$$g(x) = -x^2$$

Variable

$$g(x) = -x^2$$



# verschobene Normalparabel

# (Scheitelpunktform)

$$f(x) = (x-d)^2 + e$$

- Variable X
- Verschiebung ↔
- e Verschiebung ↓
- Scheitelpunkt

# allgemeine Form

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

# Nullstellenform

$$f(x) = a \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)$$

# Scheitelpunktform

$$f(x) = a \cdot (x - d)^2 + e$$


- Variable Χ
- reelle Zahl
- (Streckung) b,c reelle Zahlen
- $x_1, x_2$  Nullstellen
- $Verschiebung \ \leftrightarrow$
- e Verschiebung \$\(\psi\)
- S Scheitelpunkt

# **Quadratische Gleichungen**

# allgemeine Form

$$ax^2 + bx + c = 0$$

#### Normalform



 $p = \frac{b}{a}$ 

$$q = \frac{c}{a}$$

$$x^2 + px + q = 0$$

# Lösungsformel

Variable a, b, c reelle Zahlen p,q reelle Zahlen  $x_1, x_2$  Lösungen


$$X_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q}$$

$$x_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q}$$

$$p = -(x_1 + x_2) \qquad q = x_1 \cdot x_2$$

$$a = X_1 \cdot X$$

## **Lineare Funktionen**



# **Normalform**

$$f(x) = m \cdot x + b$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$


$$x_1, x_2$$
 Variablen

$$y_1 = f(x_1)$$

$$y_1 = f(x_1)$$

$$y_2 = f(x_2)$$


# **Exponentialfunktionen**



# **Allgemeine Form**

$$f(x) = c \cdot a^x$$

- Variable Χ
- Ausgangswert С
- **Basis** а




# **Wachstum**

$$q = 1 + \frac{p}{100}$$

$$G_n = G_0 \cdot q^n$$

- $G_n$ Endwert
- Anfangswert
- Prozentzahl р
- Wachstumsfaktor q
- Zeitspanne n

# **Exponentialgleichung**



$$G_n = G_0 \cdot q^n$$

$$n = \log_q \frac{G_n}{G_0} = \frac{\log \frac{G_n}{G_0}}{\log q}$$

- Endwert  $G_n$
- Anfangswert  $G_{o}$
- Wachstumsfaktor q
- Zeitspanne

# **Potenzgesetze**

$$a^0 = 1$$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

a,b reelle Zahlen a>0, b>0

m,n natürliche Zahlen